

122
IO. CHRIST. FABRICII
PROFESS. HAVNIENS. SOC. REG. NORV. ET
BEROL. MEMBR.

SYSTEMA ENTOMOLOGIAE,

SISTENS
INSECTORVM
CLASSES, ORDINES, GENERA,
SPECIES,
ADIECTIS
SYNONYMIS, LOCIS, DESCRIPTIONIBVS,
OBSERVATIONIBVS.



·FLENSBVRGI ET LIPSIAE
IN OFFICINA LIBRARIA KORTII
1775.

137. PHALANGIUM. *Palpi porrecti, incurvi.**Maxilla superior, chelifera.*

grossipes. 1. P. corpore minuto, cylindrico, humeris tuberculatis, pedibus longissimis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1027. 1.
Phalangium marinum. *Srroem. Sondm.* 208. tab. 1. fig. 16.
Habitat in mari Norwegico: tardissimum, Mytilorum testas penetrat et exhaurit.

opilio. 2. P. abdomine ovato, subtus albo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1027. 2. *Fn. Sv.* 1992.
Araneus rufus, non cristatus. *Raj. Inf.* 40. 35.
Goed. Inf. 2. tab. 49.
Mouff. Inf. 234. fig. 4.
Hoeffn. Inf. 2. tab. 9.
Bradl. nat. tab. 24. fig. 2.
Clerk. aran. tab. 6. fig. 10. 3.
Sultz. Inf. tab. 22. fig. 140.
Habitat in Europa, America, nocte vagatur.

cornutum. 3. P. abdomine depresso, maxilla conica ascendente, palpis pediformibus.
Phalangium cornutum abdomine depresso, rostro bicorni, palpis pediformibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1028. 3.
Phalangium. *Geoff. Inf.* 2. 629. 1. tab. 20. fig. 6.
Araneus cinereus, cristatus. *Raj. Inf.* 39. 35.
Schueff. Elem. 13. fig. 9.
— — *Icon.* tab. 39. fig. 13.
Habitat in Europa, Anglia.

bimaculatum. 4. P. abdomine atro: maculis duabus albis.
Habitat in Anglia. Capt. die VI. Maj.
Triplo minus praecedentibus. Corpus ovatum, atrum, maculis duabus oblongis, albis ad basin abdominis. Linea submarginalis tenuissima, alba, abdomen cingit. Pedes elongati, atri.

5. *P. chelis ramosis, ano fetifero. Linn. Syst. Nat. 11. caudatum.*
1029. 8. *Mus. Lud. Ulv. 426.*

Scorpio. *Gronov. Zooph. 952.*

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 7. 8.

Habitat in India orientali.

6. *P. brachiis dentatis, pedibus primis longissimis fili- reniforme.*
formibus, thōrace reniformi. Linn. Syst. Nat. 11.
1029. 9. *Mus. Lud. Ulv. 427.*

Phalangium palpis longissimis, crassis. *Gronov.*
Zooph. 935.

Tarantula fusca major, pedibus anterioribus crassio-
ribus, aculeatis et unguiculatis, fere cheliformibus,
proximis longissimis et tenuissimis. *Brown. Lam.*
409. tab. 11. fig. 3.

Cancellus araneoides. *Pet. pteriog. tab. 20. fig. 12.*

Habitat in Carolina, Iamaica.

Ultimae duae species habitu ab hoc genere diffe-
runt. An proprii generis?

